


ЛИСТЕРИОЗ

Листериоз — зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени, селезенки и проявляющаяся многообразием симптомов, чаще — ангинозно-септическими и нервными клиническими формами. Возбудителем является бактерия *Listeria monocytogenes*.

Заболевание развивается только у 20% инфицированных лиц. Важную роль играет состояние иммунной системы. Наибольшая восприимчивость отмечается у больных онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, длительно получающих глюкокортикостероиды, иммунодепрессанты, ВИЧ-позитивных пациентов, новорожденных, пожилых людей. Листериоз встречается во всех странах мира. Заболеваемость наблюдается во всех возрастных группах.

Инфицирование людей чаще наблюдается весной и летом.



МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНА В:



Может загрязнять **ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ**
(употребление пищевых продуктов, содержащих *Listeria monocytogenes*, в больших количествах, является основным путем передачи инфекции)

Listeria monocytogenes – подвижная неспорообразующая грамположительная палочка. Образует капсулу, трансформируется в L-формы. Паразитирует внутри клеток, обуславливая медленное латентное развитие инфекции.



ОСНОВНАЯ ГРУППА РИСКА



**БЕРЕМЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ**

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ



**ЛИЦА С ОСЛАБЛЕННОЙ
ИММУННОЙ
СИСТЕМОЙ**
(ВИЧ/СПИДом, лейкемией,
раком, пересадкой почки
и стероидной терапией)

ПРОФИЛАКТИКА ЛИСТЕРИОЗА:

1. Проведение ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических мероприятий в населенных пунктах, в животноводческих хозяйствах и предприятиях по переработке продуктов животного происхождения
2. Термическая обработка пищевых продуктов
3. Борьба с листериозом животных
4. Обследование женщин, планирующих беременность