

Бешенство иначе называется гидрофобией, или водобоязнью. Это одно из тяжелейших заболеваний вирусной этиологии, которое поражает теплокровных животных, птиц и человека.

Хотя больше всего случаев заражения им происходит в Азии и Африке, встречается оно и у нас. Причем в 40% случаев укушенные инфицированными животными - дети до 15 лет.



ОСТОРОЖНО БЕШЕНСТВО!

Бешенством в основном болеют животные: и дикие, и домашние, если владельцы не захотели их привить соответствующей вакциной.

НАША СПРАВКА

Всего за 2021 год в нашей республике зафиксировано 320 случаев бешенства: 203 - среди диких, 73 - среди домашних и 44 - среди сельскохозяйственных животных. Доминирующий вид - лисица (78,3% от всех заболевших животных в данной категории). Кроме лисиц, им заболевают также собаки, кошки, енотовидные собаки, лоси, ежи и белки.

Человеку инфекция передаётся со слюной инфицированного животного через укусы, ссадины, царапины и слизистые оболочки. Инкубационный период зависит от локализации укуса и длится от 10 дней до 3-4 месяцев, может удлиняться до года и более.

При каждом обращении в учреждение здравоохранения по поводу укуса или ран, нанесённых животным, информация о нём передаётся в районную ветеринарную станцию для 10-дневного наблюдения. Если в течение этого времени зверь погибает, необходимо сразу туда сообщить.

ВАЖНО

Заразиться бешенством можно, если вы выбрали и привезли в город больное бродячее животное. В этом случае вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей и животных, которые с ним контактируют.

Также специалисты не рекомендуют приобретать питомцев через интернет: как правило, они не имеют справок и иных документов из ветеринарных лечебниц, следовательно, могут быть переносчиками вируса.

ВНИМАНИЕ!

Срочная вакцинация после попадания вируса в организм позволяет предупредить развитие заболевания.

Средств лечения бешенства нет, если вовремя не начать вводить вакцину, бешенство заканчивается летальным исходом

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛО ИЛИ ОЦАРАПАЛО ЖИВОТНОЕ

1. НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ РАНЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ.
2. ОБРАБОТАТЬ КРАЯ РАНЫ 70-ПРОЦЕНТНЫМ СПИРТОМ ИЛИ 5-ПРОЦЕНТНОЙ НАСТОЙКОЙ ЙОДА.
3. ПО ВОЗМОЖНОСТИ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА РАНУ.
4. НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ПОСЛЕ МЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ РАНЫ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ (ОТДЕЛЕНИЕ).
5. НЕ ПРЕРЫВАТЬ КУРС АНТИРАБИЧЕСКИХ ПРИВИВОК БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВРАЧА, ПОСКОЛЬКУ НАРУШЕНИЕ СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ БОЛЕЗНИ И НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ. ТАКЖЕ НЕ СТОИТ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ - МОЖЕТ СКАЗАТЬСЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ

Ваш питомец в зоне риска, если:

- вы отказались сделать ему бесплатную прививку от гидрофобии;
- вы вывозите его в регион, неблагополучный по этому заболеванию.