


СТОЛБНЯК

Столбняк, или "тризм" — острое инфекционное незаразное заболевание, вызываемое столбнячной палочкой. Инкубационный период болезни колеблется от 3 до 30 дней. Нередко к



началу болезни у человека рана заживает и заболевший не помнит о месте и характере повреждения. Сначала появляется оглушенность, головные боли, потеря аппетита, беспокойство, незначительное повышение температуры,



позже присоединяется судорожное сокращение жевательной и мимической мускулатуры. Затем судороги распространяются на всю мускулатуру. При поражении затылочных мышц и мускулатуры спины происходит выгибание туловища назад. Руки и ноги поражаются

меньше, но возможны разгибательные судороги. Особенно опасны продолжительные судороги дыхательной мускулатуры, которые и приводят к смерти.

Экстренная профилактика проводится при любых травмах и ранах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек, обморожениях, и ожогах второй, третьей и четвертой степеней, укусах животных, проникающих повреждениях или оперативных вмешательствах на желудочно-кишечном тракте, у непривитых или лиц с неизвестным прививочным анамнезом, внебольничных абортах, родах вне медицинских учреждений, гангрене или некрозе тканей любого типа, абсцессах, карбункулах, ее проводят до 20-го дня с момента получения травмы.

Иммунизация является единственным, надежным способом профилактики столбняка. Прививки делают детям с 2-ух месячного возраста, в зависимости от препарата - трехкратно. В возрасте 18 месяцев ребенку делают первую ревакцинацию. Последующие ревакцинации проводят в 6 и в 16 лет, а затем каждые 10 лет без возрастных ограничений.

Раннее обращение в хирургический кабинет или приемное отделение в медицинскую организацию и проведение экстренной профилактики столбняка, а также своевременное проведение профилактических прививок могут спасти Вашу жизнь и жизнь Ваших близких.