

КОРЬ

Это аэрозольная инфекция.
Чтобы заболеть, достаточно
побыть в одном помещении
с тем, кто уже болеет.

ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (от момента заражения до появления симптомов):
10- 18 дней, максимально – 21 день.

Первые признаки – общее недомогание, головные боли, снижение аппетита, нарушение сна. Повышается температура до 38-40 градусов. **С первых дней болезни** отмечается насморк, сухой кашель, осиплость голоса, покраснение слизистых глаз, светобоязнь. **Затем** на слизистой рта появляются белесые пятнышки с красной каймой – характерный симптом кори. **Далее начинается** период корьевой сыпи в виде пятен – вначале на лице, затем по всему телу. Не стоит допускать до этого, надо обращаться к врачу при первых признаках недомогания. Пусть лучше корь не подтвердится!



Осложнения - ларингиты, трахеобронхиты, воспаление легких, среднего уха, головного мозга, сердца, судороги, развивающиеся на фоне высокой температуры.

**ЕДИНСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЯВЛЯЕТСЯ ИММУНИЗАЦИЯ!**



Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь **вакцинация против кори** проводится детям **в возрасте 12 месяцев**, ревакцинация – **в 6 лет**.

Стоит ли отказываться от прививки?

Профилактическая прививка против кори является надежным, эффективным и безопасным средством профилактики заболевания. Более того, стоит посоветовать и взрослым – если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку, особенно собираясь ехать в другие страны, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.



Если Вам стало известно, что Вы находились в контакте с заболевшим корью, то обязательно обратитесь к врачу!

Если заболели – вызывайте врача на дом!